



Ligosan® Der Taschen-Minimierer.

Das Lokalantibiotikum für Parodontistherapie von heute.

- » **Für Ihren Behandlungserfolg:** Ligosan sorgt für eine signifikant bessere Reduktion der Taschentiefe als SRP allein.
- » **Für Ihre Sicherheit:** Dank des patentierten Gels dringt der bewährte Wirkstoff Doxycyclin selbst in tiefe, schwer erreichbare Parodontaltaschen vor.
- » **Für Ihren Komfort:** Das Gel ist einfach zu applizieren. Am Wirkort wird Doxycyclin kontinuierlich in ausreichend hoher lokaler Konzentration über mindestens 12 Tage freigesetzt.

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Ligosan 140 mg/g Gel zur periodontalen Anwendung • Zusammensetzung: 1 g Gel zur periodontalen Anwendung enthält 140 mg Doxycyclin entsprechend 161,5 mg Doxycyclinhydrochlorid. 1 vorgefüllte Zylinderkartusche mit 260 mg Gel zur periodontalen Anwendung enthält 36,40 mg Doxycyclin. Sonstige Bestandteile: Polyglycolsäure, Macrogol-DL-milchsäure/glycolsäure-Copolymer (hochviskos), Macrogol-DL-milchsäure/glycolsäure-Copolymer (niedrigviskos). • **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung der chronischen und aggressiven Parodontitis mit einer Taschentiefe von ≥ 5 mm bei Erwachsenen als Unterstützung der konventionellen nicht-chirurgischen Parodontitis-Therapie. Die offiziellen Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antimikrobiellen Wirkstoffen sind bei der Anwendung zu berücksichtigen. • **Gegenanzeigen:** Ligosan ist kontraindiziert bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Doxycyclin, andere Tetracyclin-Antibiotika oder einen der sonstigen Bestandteile, bei Patienten, die systemische Antibiotika vor oder während der Parodontaltherapie erhalten, während der Schwangerschaft, bei Kindern und Jugendlichen aufgrund von Störungen der Odontogenese, bei Patienten mit erhöhtem Risiko einer akuten Porphyrie und bei Patienten mit stark eingeschränkter Leberfunktion. • **Nebenwirkungen:** Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen, über die in den klinischen Studien berichtet wurden, sind: Schwellung der Gingiva, "kaugummiartiger" Geschmack. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Überempfindlichkeitsreaktionen: Häufigkeit nicht bekannt: Urticaria, angioneurotisches Ödem, Anaphylaxie, anaphylaktische Purpura. Innerhalb der Gruppe der Tetracyclin-Antibiotika besteht eine komplette Kreuzallergie. Weitere Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen, Schwangerschaft/Stillzeit, Nebenwirkungen: s. Angaben in der Fachinformation. • **Wirkstoffgruppe:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiinfektiva und Antiseptika zur oralen Lokalbehandlung, Doxycyclin. • **ATC-Code:** A01AB22 • **Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten.** • **Pharmazeutischer Unternehmer:** Kulzer GmbH, Leipziger Str. 2, 63450 Hanau, Deutschland • **Stand der Information:** 07/2017

Antwortfax

Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an officeAT@kulzer-dental.com
oder per Fax an +43 1 408 09 41-70.

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch unter +43 1 408 09 41 entgegen.

Bitte beachten Sie, dass Kulzer Ihre Bestellung bloß entgegen nimmt. Die Abgabe und Bezahlung der Waren erfolgt über Apotheken im Rahmen der §§ 57, 59 AMG. Die Gratiswaren werden von Kulzer geliefert.

Produkt	Packungs- einheit	Preis/PE	Anzahl	Aktions- NR
 <p>Ligosan® 140 mg/g Gel zur periodontalen Anwendung. Zur Behandlung der chronischen und aggressiven Parodontitis mit einer Taschentiefe von ≥ 5 mm bei Erwachsenen.</p>	2 x 0,26g	€ 110,50 (zzgl. 10 % USt.)		

(Ab einer Bestellmenge von 3 Packungen entfällt die Portogebühr.)

Die Abgabe durch die Apotheke erfolgt an:

Name _____

Adresse _____

Telefon _____

Datum/Unterschrift _____

Praxisstempel

Kulzer Austria GmbH
Nordbahnstraße 36/2/4/4.5
1020 Wien, Österreich
FN: 123321
Firmenbuchgericht: HG Wien

Mundgesundheit in besten Händen.



KULZER
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP